

## ☞ 주의력결핍과다활동장애(ADHD)치료제 복용시 주의점 ☞

우리병원에서 취급하는 대표적인 주의력결핍과다활동장애 치료제로 아래와 같은 약품들이 있습니다.

- 중추신경자극제 : **methylphenidate** (콘서타OROS 서방정 및 메타데이트CD서방캡슐 등)
- 비중추신경자극제 : **atomoxetine** (스트라테라캡슐 등)

## ☞ 주의력결핍과다활동장애(ADHD) 치료제를 복용할 때 어떤 점을 주의해야 하나요?

- 현재 진단받은 **질환**이 있거나 복용중인 **다른 약**이 있으면 반드시 **의사나 약사**에게 알리도록 합니다.
- **정해진 용량과 용법**을 지켜 복용합니다. 의사에게 처방받은 용량으로 일정 기간 동안 꾸준히 복용해야 하며, 의사와 상의없이 복용을 중단하지 마십시오.
- 복용을 잊은 경우 생각난 즉시 복용하십시오. 다음 복용시간이 가까운 경우에는 다음 복용시간에 1회 복용량만 복용하십시오. 절대 2배 용량 이상을 복용하지 마십시오.
- **콘서타OROS 서방정** 및 **메타데이트CD서방캡슐**은 씹거나 부수어서 복용하면 약효가 긴시간동안 유지되는 성질을 잃으므로 **씹거나 부수어서 복용하지 않도록** 합니다.
- **스트라테라캡슐**은 **안자극성**이 있어 **캡슐을 열어서는 안됩니다**. 캡슐 내용물이 눈에 들어갔을 경우, 눈을 즉시 헹구고 의학적 자문을 얻어야합니다. 손과 이 약이 묻은 곳은 가능한 빨리 씻어야합니다.

## ☞ ADHD치료제 복용시 특히 주의하여 관찰해야 하는 부작용으로는 어떤 것들이 있나요?

아래 증상이 나타날시 즉시!!! 의사와 상의하세요~~~

- **methylphenidate** , **atomoxetine** 공통
  - 혈압상승, 맥박수증가를 야기할 수 있으므로 복용 중 **흉통,호흡곤란,실신** 등의 증상이 나타나는 경우
  - 기존의 증상이 악화되거나 환각, 환청 등의 정신과적 증상이 새롭게 나타나는 경우
- **atomoxetine**
  - 자살 생각이나 행동, 불안, 흥분, 초조, 불면, 조증, 안절부절 혹은 우울해 할 때
  - 가려움, 복통, 진한 소변색, 황달 등 간기능 이상 징후를 보일 때

## ☞ ADHD치료제의 대표적인 부작용으로는 어떤 것들이 있나요?

아래 증상이 심하거나 없어지지 않을 경우 의사와 상의하십시오.~

### ○ methylphenidate

- 두통, 위통, 불면증, 식욕저하, 안절부절, 어지러움 등의 증상이 자주 나타날 수 있습니다.
- 식욕저하로 성장에 영향을 줄 수 있으므로 성장을 주의깊게 모니터링하고 필요시 영양사의 상담을 받을 것을 권장합니다.
- 수면 장애를 악화시킬 수 있으므로 오전에 복용하는 것이 도움이 됩니다.

### ○ atomoxetine

- 소화불량, 구역, 구토, 피로, 식욕감소, 어지러움, 기분변화 등의 증상이 자주 나타날 수 있습니다.
- 소화불량 등의 위장관계 증상이 가장 흔하며, 음식과 함께 복용하는 것으로 증상을 줄일 수 있습니다.

## ☞ ADHD치료제는 어떤 작용을 가지는 약인가요?

ADHD 환자의 집중력 지속시간을 개선시키고 주의산만이 감소하며 지시에 따르고 할당된 업무를 완성하는 능력이 개선되며 충동과 공격성을 줄이는 효과를 가집니다.

## ☞ 주의력결핍과다활동장애(ADHD) 란?

주의력결핍과다활동장애(Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD)는 아동기에 가장 일반적으로 나타나는 장애로서 지속적인 주의력 산만(Inattention) 및 과다활동(Hyperactivity), 충동성(Impulsivity)을 특징으로 합니다.

☞ 해당 의약품에 대한 부작용 등 자세한 정보는 인터넷을 통해 확인이 가능합니다.

약학정보원 홈페이지 「<http://www.health.kr/>」 >> 의약품검색

식품의약품안전처 이지드럭 「<http://ezdrug.mfds.go.kr/>」 >> 정보마당 >> 의약품등 정보