

☼ 비스테로이드성 소염진통제 복용시 주의점 ☼

비스테로이드성 소염진통제는 해열, 진통, 소염 효과의 주된 효능은 있으나 부신피질호르몬 합성이나 스테로이드에 대한 영향은 나타내지 않습니다. 우리병원에서 취급하는 대표적인 비스테로이드성 소염진통제는 아래와 같은 약품들이 있습니다.

- ibuprofen (이부서스펜시럽)
- naproxen (낙센에프정 500mg)

우리병원에서 취급하는 비스테로이드성 소염진통제 복용시 주의점 등은 아래와 같습니다.

☼ 비스테로이드성 소염진통제를 복용할 때 어떤 점을 주의해야 하나요 ?

- 의사나 약사의 상의없이 임의로 용량을 바꾸거나 복용을 중단해서는 안됩니다.
- 음주를 하지 않아야 합니다. 알콜성 음료의 섭취를 피하세요.
- 다른 질환이 있거나 복용중인 다른 약이 있으면 반드시 의사나 약사에게 미리 알리도록 합니다.
- 임신 또는 계획이 있을 경우 의사와 상의해야 합니다.
- 전문가와 상의없이 장기간 투여하지 마십시오.
- 만약 숨쉬기 힘들거나 얼굴 또는 목이 붓는 것과 같은 과민성 쇼크 증상이 나타나면 즉시 응급실로 가야합니다.
- 소화불량, 속쓰림, 구역, 구토 등의 위장장애 증상이 심할 경우 의사와 상의하세요.

☼ 비스테로이드성 소염진통제 복용시 특히 주의하여 관찰해야 하는 부작용으로는 어떤 것들이 있나요 ?

아래 증상이 나타날시 즉시!!! 의사와 상의하세요~~~

- 발진, 두드러기, 안면부종
- 숨 쉬기 곤란함, 목심, 이명
- 빈맥, 가쁜 호흡
- 위 출혈, 흑변, 대변에 피가섞여 나오는 경우 등
- ★ 약품별로 나타날 수 있는 부작용은 아래 사이트 등을 통해 확인하세요~

★ 해당 개별 의약품에 대한 부작용 등 자세한 정보는 인터넷을 통해 확인하세요~

약학정보원 홈페이지 「<http://www.health.kr/>」 >> 의약품검색

식품의약품안전처 이지드럭 「<http://ezdrug.mfds.go.kr/>」 >> 정보마당 >> 의약품등 정보